

Öfversigt af Kongl. Vetenskaps-Akademiens Förfhandlingar, 1871. N:o 5.  
Stockholm.

Acanthiidæ americanæ, descriptæ ab  
O. M. REUTER.

Tab. VII.

[Communic. d. 10 Maii 1871.]

Fam. ACANTHIIDÆ REUT.

Subf. **Anthocorina** REUT.

Genus **Lyctocoris** HAHN.

(FIEB., Eur. Hem., p. 38, 40.)

*L. Fitchii* REUT.

Oblongo-ovatus, pallide ferrugineus, antennis, pedibus hemelytrisque pallide flavo-testaceis, his cuneo dilute ferrugineo. ♂♀. Long. 3½ m.m.

Newyork (HOLMGREN). Mus. Helsingf.

*L. campestris* F., STÅL (*domestico* SCHILL.) valde affinis. Corpus oblongo-ovatum, pallide ferrugineum, nitidulum, capite pronotoque paullo obscurioribus. Caput ferrugineum, fere æque latum ac longum, oculis nigris. Antennæ pallide flavæ, articulo primo secundoque apice summo obscurioribus, primo apicem capitum superante. Rostrum pallide flavum, coxas intermedias paullo superans, articulo primo capite paullo breviore. Pronotum ferrugineum, subsemilunare, lateribus apicem versus sensim modice rotundato-angustatum, apice profunde basique late emarginatum ibique longitudine media plus quam duplo latius; disco vix impressum, subtiliter punctulatum. Scutellum magnum, triangulare, punctulatum, postice depresso. Hemelytra pallide flavo-testacea, crebre et subtiliter punctulata, cuneo dilute ferrugineo. Abdomen apice pilis destitutum. Pedes pallide flavi.

Genus **Dolichomerus** REUT.

(δολιχός, longus; μέρος, articulus.)

Corpus oblongum vel oblongo-ovatum, subglabrum. Caput inter antennas latius productum. Antennæ pilosulae, articulo primo apicem capitum attingente, secundo apicem versus incrassato, duobus ultimis filiformibus, reliquis multo tenuioribus. Rostrum coxas posticas attin-

gens, articulo primo longitudine capitidis vel capite longiore. Pronotum basi apiceque emarginatum, lateribus a basi modice, antice sensim fortius rotundato-angustatum, disco postice punctulatum. Hemelytra abdomine parum longiora. Membrana venis quattuor instructa. Areola alarum hamo instructa. Abdomen lateribus pilis destitutum. Femora antica leviter inerasata.

Gen. *Lyctocori* HAHN valde affinis, longitudine articuli rostri primi membranaque quadrivenosa distinguendus.

*D. elongatus* REUT.

Oblongus, fusco-brunneus, rostro pedibusque testaceis; embolio apice puncto testaceo saepe notato, basi corii anguste cuneoque fuscouscentibus; membrana fuscouscente, basi pallida; rostri articulo primo apicem prosterni attingente. Long. 4½ m.m. — Tab. VII. fig. 1.

Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Corpus oblongum, fusco-brunneum, subglabrum. Caput longe productum, latitudine longius. Antennae brunneae, articulo secundo primo plus quam triplo longiore, duobus ultimis longitudine aequalibus. Rostrum testaceum, articulo primo apicem prosterni attingente. Pronotum fusco-brunneum, basi profunde emarginatum, longitudine media vix dimidio latius, lateribus leviter sinuatum, disco postice utrinque impressione transversali notatum. Hemelytra fusco-brunnea; embolio apice puncto testaceo saepe notato, basi corii anguste cuneo-que fuscouscentibus. Membrana fuscouscens, basi pallida. Pedes testacei.

*D. Stålii* REUT.

Oblongo-ovatus, fusco-brunneus, rostro apicem versus pedibusque testaceis; hemelytris apice summo clavi emboliique saepe testaceis, cuneo fusco; membrana fuscouscente, basi pallida; articulo rostri primo capite haud longiore. Long. 4 m.m.

Texas, Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Præcedenti affinis, statura minus oblonga, pronoto apicem versus minus angustato, lateribus vix siuato articuloque rostri primo breviore mox distinguendus. Corpus oblongo-ovatum, fusco-brunneum, sublæve. Caput latitudine vix longius. Antennae brunneae, articulo secundo primo plus quam duplo longiore. Rostrum fusco-brunneum, apicem versus pallidescens, articulo primo capiti aequilongo. Pronotum basi late et profunde emarginatum, longitudine media duplo latius, basi quam apice duplo latius, lateribus haud sinuatum. Hemelytra fusco-brunnea, glabra, punctulata, apice summo embolii et clavi testaceo, cuneo fusco. Membrana fuscouscens, basi flavescente-hyalina. Pedes testacei.

Genus *Calliodis* REUT.

(*χάλλος*, pulcher; *εἰδος*, species.)

Corpus oblongum, subtiliter pubescens. Caput inter antennas modice productum, pone oculos in collum convexum et læve con-

strictum. Antennæ subtiliter et parce pilosæ, articulo primo apicem capitis parum superante, secundo apicem versus leviter incrassato, ultimis tenuibus. Rostrum coxas posticas attingens, articulo primo longitudine capitis. Pronotum convexiusculum, apicem versus modice angustatum, lateribus paullo pone apicem fortiter rotundato-ampliatum, basi apiceque subtruncatum. Hemelytra abdomine paullo longiora, breviter pubescentia et pilosa. Abdomen apice pilis nonnullis instructum. Coxæ approximatæ.

*C. picturata* REUT.

Rufo-testacea, capite, apice colloque exceptis, angulis pronoti posticis, apice scutelli, margine clavi interiore, fascia ante apicem corii cuneoque toto fuscis; membrana infuscata, basi pellucida. Long.  $2\frac{2}{3}$  m.m. — Tab. VII. fig. 2.

Brasilia (F. SAHLBERG). Mus. SAHLB.

Corpus oblongum, rufo-testaceum, subtiliter et parce flavo-pubescentia. Caput nigrum, nitidulum, apice testaceo, pone oculos in collum latum, rufo-testaceum, nitidum, lœve et convexiusculum constrictum. Antennæ ferruginea, parum pubescentes, articulo secundo primo fere triplo longiore, ultimis subæquilongis, tertio secundo paullo breviore. Rostrum rufo-testaceum. Pronotum capiti æquilongum, rufo-testaceum, angulis posticis nigris, lateribus paullo pone annulum collarem fortiter rotundato-ampliatum, deinde leviter sinuatum, basi longitudine media fere duplo latius, disco pone medium transversim late impressum, postice subtilissime punctulatum. Scutellum ferrugineum, apice depresso, fuscescens. Hemelytra rufo-testacea, fusco-variegata, pilis flavis brevibus depresso aliisque parum longioribus fuscis subtiliter pilosa. Abdomen subtiliter pubescens, apice pilis nonnullis instructum. Pedes rufo-testacei, femoribus anticis elongatis.

Genus *Solenonotus* REUT.

(σωλήν, sulcus; νότος, notum.)

Corpus ovatum, subglabrum. Caput inter oculos prominulos sat latum, inter antennas constrictum, modice productum, pone oculos collo magno, lato, valde convexo, nitido et lœvi instructum. Antennæ breviter pilosæ, articulo primo apicem capitis fere attingente, secundo apicem versus incrassato. Rostrum coxas anticas paulo superans, articulo primo oculos attingente. Pronotum apicem versus leviter angustatum, basi parum sinuatum, apice truncatum, lateribus subtiliter marginatum, mox pone apicem rotundato-angulatum, disco deplanatum, ad angulos anticos deflexum, medio sulco longitudinali distinctissimo notatum, postice transversim strigulosum. Hemelytra glabriuscula. Membrana venis nullis conspicuis. Abdomen lateribus apicem versus setis 6 longissimis instructum. Femora antica reliquis crassiora.

*S. sulcifer* STÅL.

Nigricans, nitidus, tibiis tarsisque testaceis; hemelytris fuscis, opacis, clavo marginibus interioribus, embolio toto cuneoque extus obscurioribus; membrana fusca. ♂. Long. 3 m.m. — Tab. VII. fig. 3.

*Anthocoris? sulcifer* STÅL, Rio Janeiro-traktens Hemipterfauna p. 43, 4 (1860).

Brasilia, Rio Janeiro (F. SAHLBERG). Hus. Holm.

Genus **Piezostethus** FIEB.

(Eur. Hem., p. 38, 41.)

*P. sordidus* REUT.

Niger, nitidus, antennis concoloribus, rostro femoribusque piceis, his basi, tibiis tarsisque ferrugineis; hemelytris sordide albidis, commissura late cuneoque nigro-piceis; membrana sordida, femoribus anticis crassis. Long. 2 $\frac{3}{4}$  m.m.

*Var. a:* Corio albido, clavo, embolio cuneoque pallide ferrugineis, commissura cuneoche medio nigris.

*Var. b:* Ut var. a, sed embolio cuneoche fere totis nigris.

*Var. c:* Hemelytris nigro-piceis, tantum medio clavi et corii sordide albidis.

Texas (BELFRAGE). Mus. Holm.; Brasilia (F. SAHLBERG). Mus. SAHLB.

*P. galactino* FIEB. magnitudine staturaque simillimus, commissura hemelytrorum cuneoche late nigris et membrana sordida distinguendus. Corpus nigrum, nitidum, sub-læve. Caput inter antennæ brevius productum. Antennæ pilosæ, piceo-nigræ, articulo primo apicem capitis attingente, secundo apicem versus incrassato, primo duplo longiore, ultimis filiformibus et reliquis multo tenuioribus, longitudine æqualibus. Rostrum coxas intermedias attingens, articulo primo medium oculi fere superante. Pronotum nigrum, nitidum, apicem versus modice angustatum, basi parum sinuatum, apice subtruncatum, disco medio late et profunde impressum, antice læve, postice transversim rugulosum. Scutellum nigrum, nitidum, antice læve, postice depresso, transversim rugulosum. Hemelytra sordide albida, subtilissime flavo-pubescentia, commissura cuneoche plus minusve late nigris, saepe etiam embolio nigro-piceo. Membrana sordida, fuscescens. Pedes ferruginei, femoribus basi excepta piceis, anticis sat incrassatis.

*P. binotatus* REUT.

Niger, nitidus, antennis concoloribus, rostro pedibusque ferrugineis, femoribus basi excepta dilute piceis; hemelytris sordide albido-testaceis, commissura, apice clavi late, embolio cuneoche totis nigris, clavo paulo pone medium puncto purpureo notato; membrana fuscescente. Long. 2 $\frac{3}{4}$  m.m.

Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Præcedenti statura corporis structuraque antennarum, rostri, pedum etc. simillimus, clavi pictura insigni distinctus.

Genus **Scoloposcelis** FIEB.

(Wien. Ent. Monatschr. VII, N:o 2.)

*S. flavigornis* REUT.

Nigro-piceus, antennis, rostro apicem versus, tibiis, tarsis basi-que abdominis testaceis; hemelytris albidis, clavo marginibus interioribus, embolio cuneoque piceis; membrana alba; pronoto basi late et profunde emarginato, angulis posticis obtusiusculis; femoribus anticis et posticis valde dilatato-incrassatis. Long.  $3\frac{1}{2}$  m.m.

Texas (BELFRAGE). Mus. Holm.

*Sc. obscurella* ZETT. statura et *Sc. pulchella* ZETT. colore similimus, antennis testaceis mox distinguendus. Angustus, elongatus, nigro-piceus, nitidus. Caput inter antennas longius productum, pone oculos in collum latum constrictum, latitudini æquilongum. Antennæ ferrugineæ, pilosulæ, articulo primo apicem capitis attingente, secundo apicem versus incrassato, primo duplo longiore, duobus ultimis tenuioribus, longitudine æqualibus. Rostrum piceum, dimidio apicali testaceum, medium mésosterni attingens, articulo primo oculos attinente. Pronotum nigrum, nitidum, lateribus apicem versus sat angustatum et subtiliter marginatum, basi late et profunde emarginatum, apice truncatum, disco inæquale, deplanatum, postice subtilissime rugulosum, medio canalicula tenui longitudinali, utrinque abrupta, notatum. Scutellum nigrum, nitidum, postice depresso. Hemelytra albida, nitida, subglabra, clavo marginibus interioribus, embolio cuneoque piceis. Membrana alba, 4-venosa. Abdomen nigro-piceum, basi late ferrugineum, apice pilis pluribus instructum. Pedes testacei, femoribus piceis, anticis et posticis valde dilatato-incrassatis, anticis subtus crenulatis.

Genus **Poronotus** REUT.

(πῶρος, callus; νῶτος, notum.)

Corpus ovatum, pubescens, supra parce pilosum. Caput inter antennas modice productum, pone oculos in collum breve constrictum. Antennæ pilosæ, articulo primo apicem capitis attingente, secundo apicem versus incrassato, ultimis reliquis multo tenuioribus. Rostrum coxas anticas attingens, articulo primo insertionem antennarum attingente. Pronotum trapeziforme, apicem versus valde angustatum, basi profunde et minus late emarginatum, angulis posticis acutiusculis, apice truncatum, annulo collari distinctissimo instructum, disco medio profunde transversim impressum, antice callo magno, lœvi instructum, postice utrinque subcallosum. Hemelytra pilis

sparsis instructa, embolio apicem versus lato, margine exteriore reflexo. Membrana vena obsoletissima. Coxæ sat approximatæ.

*P. discifer* STÅL.

Nigro-piceus, nitidus, supra parce flavo-pilosus, capite, pronoto antice scutelloque dilutioribus; antennis, rostro pedibusque flavo-testaceis; antennarum articulis duobus ultimis longitudine æqualibus; pronoto lateribus leviter rotundato et sinuato; hemelytris nigro-fuscis, opacis, pilis longioribus flavis depresso-parce pilosis, margine laterali, basi corii emboliique et fascia corii apicali flavo-testaceis; margine embolii laterali subrecto; membrana nigro-fusca. Long.  $2\frac{1}{2}$ — $2\frac{1}{4}$  m.m.—Tab. VII. fig. 4.

*Xylocoris discifer* STÅL, l. c., p. 44, 1.

Brasilia, Rio Janeiro (F. SAHLBERG). Mus. Holm. et SAHLB.

*P. constrictus* STÅL.

Pallide testaceo-flavescens, capite pronotoque pilis longis parce instructis; oculis nigris; pronoto lateribus leviter sinuato; hemelytris subtiliter flavo-pubescentibus, pilis dilute fuscescentibus erectis, præsertim in clavo positis, instructis, hoc punctis sat magnis seriatim notato; corio cuneoque lœvibus; margine interiore anguste fuscescente; membrana pallida. Long.  $2\frac{1}{2}$  m.m.

*Xylocoris constrictus* STÅL, l. c. p. 44, 3.

Brasilia, Rio Janeiro (F. SAHLBERG). Mus. Holm. Unicum specimen in nave, e Batavia veniente, Prof. MÄKLIN Helsingforsiae cepit. Mus. Helsingf.

Genus *Lasiochilus* REUT.

(λάσιος, pilosus; χεῖλος, margo.)

Corpus oblongum, pubescens, supra longe pilosum. Caput inter antennas minus longe productum, pone oculos in collum latum et minus breve constrictum. Antennæ longe pilosæ, articulo primo apicem capitidis superante, secundo apicem versus incrassato, ultimis filiformibus, reliquis multo tenuioribus. Rostrum coxas intermedias attingens, articulo primo insertionem antennarum attingente. Pronotum apicem versus sat angustatum, apice levissime emarginatum, annulo collari brevissimo instructum, basi late emarginatum, lateribus pilis brevibus ciliatis. Hemelytra longitudine abdominis, longius pilosa, cuneo subglabro, embolio lato, margine exteriore pilis longis ciliato. Membrana subcoriacea. Pedes antici intermediis longiores, femoribus elongatis; coxae approximatæ.

*L. pallidulus* REUT.

Totus pallide flavescens, pallide pubescens et pilosus, membrana concolor; antennarum articulo primo, oculis ocellisque nigricantibus. Long.  $2\frac{3}{4}$  m.m.—Tab. VII. fig. 5.

Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Corpus totum pallidum, flavescentis, pallide pubescens et pilosum. Caput parce pilosum, latitudine paullo longius, oculis ocellisque nigricantibus. Autennæ pallide flavescentes, longe pilosæ, articulo primo nigricante, apicem capitis superante, secundo primo plus quam duplo longiore, tertio secundo longitudine æquali et quarto paullo longiore. Pronotum capiti subæquilonsum, basi longitudine media duplo latius, lateribus leviter sinuatis, disco pilis longis instructum. Scutellum postice parum depresso, punctulatum. Hemelytra lateribus mox pone medium leviter ampliato-rotundata, pallide flava, longe pallido-pilosa, clavo obsoletins punctulata, embolio cuneoque glabris et lævibus. Membrana coriacea, pallide flava. Pedes pallide flavescentes, longius pallido-pilosæ.

Genus **Dilasia** REUT.

(δίς, bis; λασιος, pilosus.)

Corpus oblongum, pubescens. Caput inter antenas modice productum, pone oculos in collum latum et breve constrictum. Antennæ longe pilosæ, articulo primo apicem capitis attingente, secundo apicem versus inerassato, ultimis filiformibus, reliquis multo tenuioribus. Rostrum coxas intermedias attingens, articulo primo oculos attingente. Pronotum trapeziforme, basi levissime sinuatum, apice truncatum, annulo collari lato et brevissimo instructum, lateribus pilis brevibus ciliatum, disco pone medium late impressum, antice læve, convexiusculum, postice transversim rugulosum. Hemelytra abdomine paullo breviora et angustiora, lateribus pilis brevioribus ciliata, supra pilis depressis aliisque erectis instructa; embolio angusto. Membrana venis tribus instructa. Abdomen lateribus apicem versus pilosum. Pedes longius pilosi, coxis approximatis, femoribus anticis paullo inerassatis.

*D. fuscula* REUT.

Fusco-testacea, pallide pubescens, supra parce fusco-pilosa, antennis, rostro pedibusque flavo-testaceis; capite pronotoque fusco-piceis, nitidis, parce fusco-pilosæ; scutello apice depresso hemelytris que fuscis, opacis, his pilis flavo-micantibus depressis aliisque fuscis erectis pilosis; membrana pallide fuscescente. Long.  $2\frac{3}{4}$  m.m. — Tab. VII. fig. 6.

Texas, Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Corpus oblongum, fusco-testaceum, tenuiter pubescens, supra parce fusco-pilosum. Caput latitudini subæquilonsum, piceum, nitidum, pilis fuscis nonnullis instructum. Antennæ flavo-testaceæ, longe pallido-pilosæ, articulo secundo primo haud duplo longiore, ultimis longitudine æqualibus, tertio secundo paullo breviore. Rostrum flavo-testaceum. Pronotum piceum, nitidum, capiti subæquilonsum, basi quam apice plus duplo latius, lateribus levissime sinuatum, pilis flavescentibus brevibus retrorsum vergentibus dense ciliatum aliisque nonnullis longis fuscis antrorsum vergentibus instructum, disco parce

fusco-pilosum. Scutellum pieceum, nitidum, apice depresso, fuscum, opacum. Hemelytra fusca, opaca, lateribus rectis pilibus brevibus flavigantibus dense ciliata, supra pilis depresso flavescentibus aliisque erectis fuscis pilosa. Membrana dilute fuscescens. Abdomen fusco-testaceum, lateribus apicem versus longe pilosum. Pedes flavo-testacei, longius remote pallido-pilosi.

Genus **Dasypterus** REUT.  
(δασὺς, hirtus; πτέρυξ, ala.).

Corpus breve, ovatum, pubescens. Caput inter antennas modice vel breviter productum, postice collo lato, levè instructum, latitudi subæquilogum. Antennæ pilosæ, articulo primo apicem capitis attingente, secundo apicem versus incrassato, duobus ultimis filiformibus, tenuibus, quarto tertio longiore. Rostrum coxas anticas paullo superans, articulo primo insertionem antennarum attingente. Pronotum basi profunde et minus late emarginatum, apice subtruncatum, annulo brevissimo parum distincto instructum, lateribus apicem versus sensim rotundatum, sat angustatum, disco punctulatum, medio transversim impressum, antice callosum. Scutellum medio late impressum. Hemelytra abdomine paullo longiora, punctulata, dense, fortiter pubescentia, embolio apicem versus lato, margine exteriore crassiusculo. Pedes simplices.

*D. limbatellus* STÅL.

Nigro-pieceus, antennis, pedibus, apice capitis, angulis pronoti posticis, marginibus hemelytrorum lateralibus, stria transversali ad apicem corii membranaque flavo-testaceis; pronoto capite parum longiore, basi quam apice fere quadruplo latiore; hemelytris dense, fortiter pallide-pubescentibus. Long. 2—2½ m.m. — Tab. VII. fig. 7.

*Xylocoris limbatellus* STÅL, l. c., p. 44, 2.

Brasilia, Rio Janeiro (F. SAHLBERG). Mus. Holm.

*D. assimilis* REUT.

Flavo-testaceus, supra fortiter flavo-pubescent, oculis nigris. hemelytris piceis, dense fortiter flavo-pubescentibus, basi margineque laterali flavo-testaceis; membrana fuscescente. Long. 1½—2 m.m.

Texas, Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Præcedenti similis, sed minor, aliter coloratus, capite pone oculos brevius constricto, pronoto basi minus profunde emarginato.

Genus **Triphleps** FIEB.  
(Eur. Hem., p. 39, 42.)

*T. lepidus* STÅL.

Niger, nitidus, antennis, articulo primo excepto, geniculis, tibiis, tarsis hemelytrisque albido-testaceis, his clavo basi, corio apice cuneo-

que toto nigro-fuscis; pronoto basi leviter emarginato, longitudine media plus quam duplo latiore, apice truncato, longitudine media parum angustiore, lateribus a basi ultra medium recto, deinde levisime rotundato; marginato, disco fortius punctulato, medio impresso, paullo pone angulos anticos carinula transversali elevata instructo; membrana tota albido-hyalina. Long.  $1\frac{1}{2}$  m.m.

*Anthocoris lepidus* STÅL, l. c., p. 43, 3.

*Var. b:* Hemelytris tantum cuneo piceo.

Brasilia, Rio Janeiro (F. SAHLBERG); Buenos Ayres, Mus. Holm.

*T. rugicollis* REUT.

Niger, nitidus, antennis, articulo primo excepto, apice femorum anticum, tibiis anterioribus, tarsis omnibus hemelytrisque albido-testaceis, his clavo-margine interiore anguste, embolio apice cuneoquaque toto nigro-fuscis, membrana tota hyalina; pronoto basi leviter sinuato et longitudine media duplo latiore, apice truncato, longitudine media angustiore, lateribus subrecto, subtiliter marginato, disco antice laeviusculo, subcalloso, postice fortiter ruguloso et profunde punctato, ad angulos anticos carinula transversali elevata instructo; scutello postice depresso et ruguloso. Long.  $1\frac{3}{4}$  m.m.

? *Reduvius insidiosus* SAY.

Texas (BELFRAGE). Mus. Holm.

Præcedenti simillimus; pronoto postice fortiter ruguloso, profundius punctato, lateribus subrecto distinctus.

*T. latulus* REUT.

Piceo-niger, nitidus, antennis, articulo primo excepto, geniculis anticis, tibiis anterioribus, tarsis omnibus hemelytrisque pallide testaceis, his clavo basi, corio embolioque apice et cuneo toto nigro-piceis; membrana tota albido-hyalina; pronoto basi leviter sinuato et longitudine media plus duplo, quam apice triplo latiore, hoc truncato, lateribus apicem versus sensim fortius rotundatis, disco medio leviter impresso, antice callo parum elevato, postice minus fortiter punctulato et ruguloso, ad angulos anticos carinula elevata, foveolam parvam posticam terminante; scutello dense et subtiliter punctulato et ruguloso. Long.  $2\frac{1}{4}$  m.m.

New Jersey, Carolina meridionalis (BELFRAGE). Mus. Holm.

Præcedentibus major et latior; pronoto lateribus æqualiter rotundato discoque subtilius punctulato distinctus.

Genus *Zopherocoris* REUT.

( $\zeta\omega\varphi\epsilon\varrho\delta\varsigma$ , obscurus;  $\kappa\acute{\alpha}\sigma\iota\varsigma$ , eimex.)

Corpus oblongum, subparallelum, dense subtiliter sericeo-pubescent. Caput latitudine paullo longius, inter antennas modice productum, pone oculos in collum laeve, convexiusculum, antice linea impressa terminatum, constrictum. Antennæ crassæ, subtiliter

pilosæ, articulo primo apicem capitis vix attingente, secundo apicem versus incrassato, duobus ultimis fusiformibus. Rostrum crassiusculum, coxas anticas attingens, articulo primo insertionem antennarum attinente et articulo tertio paullo breviore. Pronotum antice in annulum collarem distinctissimum constrictum, lateribus pone hunc retrorsum fortiter rotundato-ampliatum, deinde subrectum, basi levissime sinuatum, longitudine media vix latius, disco medio transversim leviter impressum, postice subtiliter ruguloso-punctatum. Hemelytra abdomine parum longiora, embolio angusto, margine exteriore recto, valde incrassato, cuneo margine exteriore apicem versus leviter rotundato. Membrana venis destituta. Abdomen lateribus apicem versus pilis instructum. Pedes validi, femoribus anticis subtus medio dente armatis.

*Z. armatus* STÅL.

Obscurè ferrugineus, sericeo-pubescent, subnitidus, subtus adhuc obscurior; antennis pedibusque dilutioribus; hemelytris fuscobrunneis, opacis, parce sericeis; membrana fusca, ad apicem cunei linea alba notata; antennis articulo secundo primo duplo longiore, quarto tertio dimidio longiore. Long. 3½ m.m. — Tab. VII. fig. 8.

*Anthocoris armatus* STÅL, l. c., p. 43, 2.

Rio Janeiro (F. SAHLBERG). Mus. Holm.

Genus *Macrotrachelia* REUT.

(μακρὸς, longus; τράχηλος, collum.)

Corpus oblongum, convexiusculum, subtilissime et parce pubescens. Caput inter antennas longe cylindrico-productum, pone oculos in collum longum constrictum, oculis minutis. Antennæ brevissime pubescentes et brevius pilosæ, validæ, articulo primo apicem capitis vix attingente, secundo apicem versus valde incrassato, duobus ultimis fusiformibus, longitudine æqualibus. Rostrum breviter pilosum, coxas anticas attingens, articulo primo insertionem antennarum vix attinente, secundo tertio fere duplo longiore. Pronotum apice in annulum collarem angustum, transversim strigulosum productum, lateribus pone hunc retrorsum subito valde ampliatum, admodum sinuatum, angulis anticis rotundatum, basi late et profunde sinuatum et quam apice quadruplo latius, disco medio fortiter impressum, antice callo magno, valde elevato lœvi instructum, postice transversim rugulosum. Scutellum apice depresso. Hemelytra abdomine paullo longiora et angustiora, embolio angusto, longitudinaliter subsulcato. Membrana magna, elongata, apice anguste rotundata, venis tribus instructa, secunda bicurvata. Abdomen apice pilis instructum, ventre convexo. Pedes robusti, pubescentes.

*M. nigro-nitens* STÅL.

Nigra, nitida, antennarum articulo tertio basi testaceo-albido; rostro tarsisque piceo-ferrugineis; hemelytris margine scutellari venis-

que aureo-sericeis, corio intus aterrimo, opaco; membrana obscure fusca, opaca, apice excepto late albo-marginata, venis duabus interioribus micantibus, prima obsoleta; antennis articulis duobus ultimis simul sumtis secundo paullo longioribus. ♂. Long.  $3\frac{3}{4}$  m.m.—  
Tab. VII. fig. 9.

*Anthocoris nigro-nitens* STÅL, l. c., p. 43, 1.

Brasilia, Rio Janeiro (F. SAHLBERG). Mus. Holm.

---

### Skänker till Vetenskaps-Akademiens Bibliothek.

*Från R. Geographical Society i London.*

Proceedings, Vol. 14: 5; 15: 1.

*Från Philosophical Society i Adelaide.*

Annual report of the South Australian Institute, 1860/61—1868/69.

” ” and transactions of the Adelaide Philosophical Society  
1866/67—1869/70.

HANSON, R. D. Law in nature. Adelaide 1864. 8:o.

Catalogue of the library. Adelaide 1869. 8:o.

*Från Société Philomatique i Paris.*

Bulletin, T. 7: 1—3.

*Från Senckenbergische Gesellschaft i Frankfurt a. M.*

Abhandlungen, Bd 7: 3—4.

Bericht, 1869—70.

*Från Naturforscher-Verein i Riga.*

Arbeiten, Neue Folge, H. 3.

*Från Astronomische Gesellschaft i Leipzig.*

Publication, 10.

Vierteljahrsschrift, Jahrg. 6: 1.

*Från Museum Francisco-Carolinum i Linz.*

Bericht, 29.

*Från Museum Carolino-Augusteum i Salzburg.*

Jahresbericht, 1870.